



**UWAGA ODRA! Warto wiedzieć że jest to choroba wirusowa /
УВАГА КІР! Варто знати, що існує вірусне захворювання**



UWAGA ODRA

Warto wiedzieć że jest to choroba wirusowa, Odra to choroba zakaźna wieku dziecięcego. Jedynym sposobem uniknięcia choroby i jej powikłań jest **szczepienie ochronne**. Zakażenie osoby **nieodpornej** prowadzi zawsze do zachorowania. *. Bieżąca sytuacja epidemiologiczna jest niepokojąca, wzrasta liczba zachorowań na odrę w Europie, najwięcej zachorowań wystąpiło w Rumunii (5 100 przypadków), Francji (2 702), Grecji (2 290), Włoszech (2 248). W tym samym czasie na Ukrainie odnotowano ponad 32 000 przypadków odry. Problem odry występuje również w Czechach, Słowacji, Niemczech, na Węgrzech, Bułgarii, Litwie, Łotwie.*

Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową lub powietrzno-kropelkową przez bezpośredni kontakt z zakażonym.

Objawy kliniczne Choroba przebiega z wysoką gorączką (do 40°C), zapaleniem spojówek i światłowstrętem, katarzem, suchym, bardzo bolesnym i męczącym kaszlem. Na skórze widoczna jest żywoczerwona zlewająca się wysypka.

Komplikacje tej choroby są częste: szczególnie u bardzo małych dzieci i u dorosłych powyżej 20 roku życia.

Metodą zapobiegania jest zaszczepienie się osoby nieuodpornionej,

W przypadku wystąpienia objawów chorobowych w trakcie pobytu, bądź po powrocie z podróży z terenów na których występują zachorowania – należy natychmiast skontaktować się ze z lekarzem.



Opracował: GSSE







УВАГА КІР

Варто знати, що існує вірусне захворювання, кір. Кір - гостре дитяче інфекційне захворювання. Немає ліку, який знищував би віруса кору. Зараження людини зі зниженою опірністю завжди доводить до захворювання, у багатьох випадках до серйозних ускладнень. Єдиним способом уникнення захворювань та їх ускладнень є профілактичні щеплення. Кір – надалі дуже серйозна загроза для здоров'я дітей: це восьма причина смерті на світі, протягом року помирає з приводу кору й ускладнень понад мільйон людей.

Зараження крапельним шляхом або повітряно – крапельним шляхом внаслідок безпосереднього контакту з інфікованим.

Клінічні ознаки: захворювання перебігає з підвищеною температурою (до 40 градусів за Цельсієм), гнійним запаленням кон'юнктиви, нежиттю, сухим, дуже болючим і виснажуючим кашлем. Шкірні зміни у вигляді яскравочервоного розлитого висипання. Часто трапляються ускладнення цієї хвороби, особливо у дуже малих дітей та дорослих вище 20 - ти років.

Методом профілактики є щеплення згідно з календарем щеплень, перед виїздом до країн Східної Європи, а також індивідуально протягом перших 72 годин від контакту з хворим.

У випадку виявлення ознак захворювання під час перебування на ендемічній території або після повернення з подорожі – треба якнайшвидше сконсультуватися з лікарем.

Опрацював GSSE





Obrazy

Zarazenia людини з зниженою опірністю завжди доводять до захворювання, у багатьох випадках до серйозних ускладнень. Одним способом уникнення захворювань та їх ускладнень, є профілактичні щеплення. Їх – надати дуже серйозна загорода для здоров'я дітей: це воєнна причина смерті на світі, протягом року лонгерає з прививку коду й ускладнень понад мільйон людей.

Зараження кральним шлком або повітряно – кральним шлком викликає безпосереднього контакту з інфікованим.

Клінічні ознаки: захворювання перебігає з підвищеною температурою (до 40 градусів за Цельсієм), нйним запаленням кон'юнктив, нежить, сухий, дуже болочиві і виснажливими кашлем. Шкіра зміни у вигляді яскраво-червоного розлитого висипання. Часто трапляються ускладнення цієї хвороби, особливо у дуже малих дітей та дорослих вище 20-ти років.

Методом профілактики є щеплення згідно з календарем щеплень, перед виїздом до країн Східної Європи, а також індивідуально протетом перших 72 годин від контакту з хворим.

У випадку виявлення ознак захворювання під час перебування на ендемічній території або після повернення з подорожі – треба викликати

лікаря. **Зараження повітряно-кральним шлком** викликає протетом, спадком на захворювання. **Висока ступінь епідеміологічного** єст інфекцією – вчало лічи захворювань на світі в Європі, найвищою захворюваністю в Римі 15-100 тисяч осіб, Франції (2 702), Греції (2 296), Німеччині (2 248). В том самому часі на **Україні** відоміми понад 32 000 випадків цієї хвороби. **Проблем** світу зустрічаються тільки в Чехії, Словаччині, Польщі, на Угорщині, Балкані, Латвії, Литві.

До захворювання доходить дорозу кропелькою і/або повітряно-кропелькою через безпосередній контакт з хворим.

Об'яву клінічну хвороба перебігає з високою гарячкою (до 40°C), запаленням spojówek і світловоїм катаром, сухим, дуже болочивим і мучаючим кашлем. На шкірі відзначається зливаний висипання. **Комплікації** цієї хвороби **са частіше:** **щеплення** у **дуже малих дітей і у дорослих** **повише 20 року** життя.

Методом запобігання є **заспечення** **сі** **особи** **неуодпориною**.

У випадку виявлення ознак захворювання в trakcie подорожі – бажано поспішити з подорожжю з території на якій відбувається захворювання – набути відповідні заходи щодо запобігання.